

МАЛЯРИЯ

МАЛЯРИЯ – ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ ЗАБОЛЕВАНИЕ

Вызывается паразитами рода Plasmodium. Эти паразиты передаются людям через укусы инфицированных самок комаров вида Anopheles, которые называются «переносчиками малярии».

Малярией ежегодно болеет свыше 500 миллионов человек, из которых около миллиона умирает.

Малярия широко распространена в странах Азии, Африки, Латинской Америки, в т.ч. и на территории некоторых республик СНГ (Азербайджан, Таджикистан).

Глобализация торговли, поездок, изменения окружающей среды и изменение климата, урбанизация приводит к появлению малярии в странах, где она ранее была неизвестна.

На территории Республики Беларусь ежегодно регистрируется до 10 случаев завозной малярии.

В течение последующих 3 лет после возвращения, при каждом обращении за медицинской помощью по поводу любого заболевания с повышением температуры, необходимо информировать врача о своем пребывании в местах распространения малярии. Позднее обращение за медицинской помощью может осложнить течение заболевания и привести к летальному исходу.

ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ

повышение температуры тела, головная боль и озноб – появляются через 10–15 дней после укуса инфицированного комара. Наиболее характерные признаки малярии: лихорадочные приступы с кратковременным ознобом, высокой температурой, головными и мышечными болями, головокружением, тошнотой, рвотой, учащенным сердцебиением, задержкой мочеиспускания – подобное состояние держится 6-8 часов и заканчивается резким падением температуры (до 35-35,6°C) и обильным потоотделением. Повторяются приступы через 1-2 дня, но могут продолжаться и без перепадов температуры.


ПРОФИЛАКТИКА

Защита помещений от проникновения переносчиков (засетчивание окон).

Защита от укусов малярийных комаров: установка прикроватных марлевых пологов, уничтожение залетевших комаров инсектицидными средствами с помощью электроиспарителей-фумигаторов; вне помещения – обработка открытых участков тела отпугивающими препаратами – репеллентами.

Химиофилактика – прием по назначению врача лекарственных противомалярийных препаратов, начиная за неделю перед выездом, весь период пребывания и еще 4-6 недель после возвращения из неблагополучного по малярии региона.

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ МАЛЯРИЯ?



**МАЛЯРИЯ ПОДАЕТСЯ
ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ**